

## RECOMMANDATIONS ET/OU BONNES PRATIQUES

04/2020

<p><b>Problèmes identifiés</b> ☞</p>	<p>Il est proposé au Sénégal une offre de tests SARS COV-2 afin de décentraliser le dépistage.</p> <p>Besoin d'identifier les laboratoires remplissant les critères d'utilisation de ces tests.</p>
<p><b>Solutions apportées</b> ☞</p>	<p>Au regard d'autres pays et des moyens disponibles, en stade épidémique, le principe devrait être de ne plus tester systématiquement. Tester tous les patients présentant des symptômes conduirait à saturer la filière de dépistage. Donc :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une approche ciblée liée au nombre limité de tests : seuls les patients symptomatiques ou à risques sont soumis aux tests</li> <li>• Sur les kits de test pour le covid19, il semblerait que l'efficacité de certains de ces kits est de 30% alors qu'elle devrait être de 80%, avec la conséquence d'aboutir à de faux négatifs qui auraient pu apparaître positifs avec les tests PCR</li> <li>• La possibilité de recourir aux laboratoires pour effectuer le diagnostic à partir de prélèvements réalisés dans les hôpitaux</li> </ul> <p>Pour les cas les plus graves et compte tenu de la fragilité de nos hôpitaux, il faudrait en priorité tester les plus fragiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les personnes hospitalisées présentant des symptômes évocateurs de COVID19,</li> <li>• les professionnels de santé présentant des symptômes évocateurs de COVID 19,</li> <li>• les foyers de cas possibles,</li> <li>• les femmes enceintes symptomatiques quel que soit le terme de la grossesse,</li> <li>• les personnes âgées vulnérables.</li> </ul> <p>Le dépistage dans les laboratoires peut se faire avec une prescription médicale.</p>
<p><b>Points de vigilance</b> ☞</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'assurer de l'agrément du fournisseur en ce moment de tension où beaucoup d'arnaques ont été signalés avec des Etats victimes</li> <li>• Tests en Laboratoire : éviter que les patients s'y rendent directement, car risques de contamination d'autres malades. Les prélèvements devraient si possible être réalisés à domicile.</li> <li>• Ne constituent pas des indications prioritaires : pneumopathie chez certaines tranches d'âge (les plus de 50 ans) sans gravité ni autre comorbidité, personne avec des signes évocateurs vivant des personnes contaminées etc.</li> </ul>

**Axes de travail investis :** Prises en charge et protection des populations les plus fragiles

- Cibles :**
- Grand public
  - Professionnels de santé
  - Décideurs